

# Groupe Naturaliste Loire-Atlantique

**GNLA - Bulletin n°29 - Septembre et Octobre 2008**

## Bulletin du GNLA



Photo S. Reebert

Dernier appel pour chronique  
naturaliste 2008 !  
Préparez vos articles  
et notes à publier...

Invitation à l'Assemblée Générale  
2008 du GNLA, qui se  
tiendra le 6 décembre à 18 h,  
à Bouaye  
(voir dernière page du bulletin)

Venez nombreux !

**Groupe Naturaliste Loire-Atlantique**  
9 , rue de Nantes - 44830 Bouaye

# *Les actualités naturalistes...*

(période du 1er septembre au 31 octobre 2008)

## **OISEAUX** (rédition S. Reeber)

Ndlr : Cette rubrique reprend les observations récentes d'oiseaux en Loire-Atlantique, parvenues au GNLA. Les données marquées d'un astérisque sont mentionnées sous réserve d'homologation nationale. Le nouveau fonctionnement de la validation des données départementales (CHD) sera présentée dans la chronique 2008 du GNLA.

Un premier groupe important de **Bernaches cravants** a été observé le 28/09 à Mesquer (MF). A noter que de nombreuses observations convergent pour indiquer un taux extrêmement faible de jeunes dans les groupes. Une **Eismature rousse** se trouvait comme d'habitude à la STEP des Moutiers-en-Retz (JM, WM), et un mâle a été observé à Beaumont le 26/10 (WR, JM). Un groupe d'**Eiders à duvet** fréquente toujours les alentours de l'îlot Bacchus (56), avec par exemple 30 oiseaux le 29/09 (DR) et le 5/10 (DH), alors qu'une femelle de cette espèce était observée le 9/10 à la Pointe Saint-Gildas (FR). Le premier **Plongeon catmarin** a été vu le 18/10 dans l'estuaire de la Vilaine (JLD), alors que le premier **Grèbe esclavon** a été noté le 5/10 aux Salineaux, les Moutiers-en-Retz (WM). Plusieurs séances d'observation des oiseaux de mer ont permis de noter quelques **Puffins fuligineux** (1 le 7/09 en 2 heures à la Pointe du Croisic (AM), 1 le 14/09 entre la Turballe et Hoëdic (WM)), ainsi que de nombreux **Puffins des Baléares** (2 le 6/09 à la Pointe du Croisic (FR), environ 50 le 14/09 entre la Turballe et Hoëdic (WM), 50+ au large de l'estuaire de la Vilaine le 28/09 (JLD, JLT, FT, AT) et autant le 18/10 (JLD), et quelques centaines devant la Turballe le 5/10 (JJG)). A signaler 40 **Océanites tempêtes** le 14/09 entre le Croisic et Hoëdic (WM), et toujours le **Pélican blanc\*** sur l'estuaire le 12/10 (DM). Au même endroit et toujours dans la catégorie des exotiques, un **Flamant rose** a été signalé le 14/10 (FL). Côté grands échassiers, quelques **Hérons pourprés** tardifs, avec par exemple 1 le 2/09 et le 5/10 au Massereau (FL), 2 dans le Marais Audubon, Couëron, le 4/09 (FR), 1 le 11/09 et le 19/10 à Fresnay-en-Retz (LB), 1 en Estuaire Loire le 7/10 (DM) et 1 en Brière, à Sainte-Reine-de-Bretagne, le 9/10 (DM).



*Puffin des Baléares -  
Entre le Croisic et  
Hoëdic (W. Maillard)*

Le **Crabier chevelu** déjà signalé au Marais Audubon depuis le 9/08 a été observé jusqu'au 4/09 (FR). Parmi les observations de **Balbuzard pêcheur** qui nous sont parvenues : 1 le 6/09 à Sissable (EA, FC), 1 les 8 et 9/09 à Batz-sur-Mer (*fide* JJG), 2 le 13/09 à la Turballe (JPT), 1 le 14/09 à Sissable (FC), 1 les 21 et 24/09 à l'Effetrie, Grand-Lieu (LB), 2 aux Prées neuves, Grand-Lieu le 22/09 (PO) et 1 à Gachet le 26/09 (BL). Un juv. de **Busard pâle\*** observé sur Pen Bron le 16/09 (JPTR) et tout aussi rare, 1 juv. d'**Aigle de Bonelli\*** à Saint-Mars-de-Coutais, Grand-Lieu, le 20/09 (LB). Les premiers **Faucons pélerins** de l'hiver ont été vus le 30/09 à Saint-Hilaire-de-Clisson (WM) et à Grand-Lieu (SR), puis le 4/10 à Mesquer (DH), suivis d'un oiseau le 26/10 à la Gournerie, Saint-Herblain (FR) et d'un oiseau le même jour à Donges-Est (DM, PB), alors que le premier **Faucon émerillon** a été signalé au marais de Pont d'Armes, Assérac, le 5/10 (DH).



*Océanites tempêtes - Entre le  
Croisic et Hoëdic (W. Maillard)*



Aigle de Bonelli - Prées neuves,  
Grand-Lieu (L. Bauza)


Côté limicoles, les **Oedicnèmes criards** de Saint-Hilaire-de-Clisson ont été bien suivis : 21 le 5/09 (WM), 27 le 9/09 (PO), 34 le 18/09 (WM), 45 les 26 et 27/09 (PO) et encore 47 le 8/10 (WM). Un beau groupe de 1100 **Huitriers-pies** était par ailleurs compté le 2/10 à Pen Bron (DR). Plus rare en Loire-Atlantique, 1 **Pluvier guignard** a été signalé le 21/09 à Donges-Est (EA) et 1 **Bécasseau de Bonaparte\*** était au Collet le 15/10 (EA). A Grand-Lieu, 1 **Bécasseau de Temminck** était présent les 3 et 4/09 (SR), un autre le 15/09, un troisième du 19/09 au 3/10, et un **Bécasseau tacheté** juv. a été vu le 5/09 (SR). Les deux premiers **Bécasseaux violets** ont été vu à la Pointe Saint-Gildas le 3/10 (TG), alors que 10 oiseaux étaient sur ce site le 25/10 (FD). Un **Courlis corlieu** assez tardif a été signalé à la Couplasse, Baie de Bourgneuf le 22/10 (JJG). Un petit afflux de **Phalaropes à becs larges** a eu lieu cet automne, avec 1 aux Pointeaux, Saint-Brévin, le 2/09 (DT), 3 le 8/09 aux Salineaux, les Moutiers-en-Retz (WM), 1 du 6 au 13/09 à Sissable, Guérande (FC, EA), 1 le 10/09 aux Salineaux à nouveau (OP, JM), 6 en mer entre le Croisic et Hoëdic le 14/09 (WM) et 2 le 13/09 à la Pointe Saint-Gildas (DT). Un **Phalarope à bec étroit** cette fois était présent entre le Croisic et Batz-sur-Mer les 8 et 9/09 (*fide* JJG). Beaucoup de **Labbes parasites** signalés à cette saison : 1 juv. du 4 au 11/09 à Grand-Lieu (SR) et plus classiquement en mer, 4 le 7/09 à la Pointe du Croisic (AM), 3 le 13/09 à la Pointe Saint-Gildas (DT), 2 le 24/09 (EA) et 1 le 5/10 (WM) au même endroit, 20+ le 28/09 sur l'estuaire de la Vilaine (JLD, FC, JLT, FT), encore 1 le 11/10 et 12 le 18/10 au même endroit (JLD, AT), de même que 2 **Grands Labbes** le 11/10 (JLD, AT) et 2 **Labbes pomarins** le 18/10 (JLD).



La fréquentation de l'estuaire de la Vilaine par la **Mouette de Sabine** est toujours aussi marquée, avec plusieurs dizaines d'oiseaux le 21/09 (JLD), 50+ le 28/09 (JLD, FC, JLT, FT), plusieurs dizaines encore le 11/10 (JLD, AT) et environ 120 le 12/10 (JLD). Ailleurs, 3 ad. ont été le 6/09 à la Pointe du Croisic (FR) et 5 le 14/09 entre le Croisic et Hoëdic (WM). Le **Goéland à bec cerclé** du Bronzais, Pénestin (56) était de retour le 21/09 (JLD). Quelques **Sternes arctiques** ont également été vues : 12 à Grand-Lieu le 8/09 et encore 2 le 12/09, 1 juv. le 8/09 aux Gâtineaux, Saint-Michel-Chef-Chef (WM), 2 le 13/09 à la Pointe Saint-Gildas (DT), 1 juv. du 8 au 10/10 aux Gâtineaux à nouveau (WR, JM).



Bécasseau de Temminck - Grand-Lieu (S. Reeber)



Phalarope à bec large -  
Les Moutiers (W. Maillard)



*Goéland à bec cerclé  
- Pénestin (J.-L. Dourin)*



*Magnifiques scènes de chasse d'un Labbe pomarin sur des Mouettes de Sabine -  
Estuaire de la Vilaine (J.-L. Dourin)*

Belle série automnale pour la **Guifette leucoptère** à Grand-Lieu (SR) : 1 juv. le 2/09, 1 ad. et 1 juv. les 3 et 4/09 et 1 juv. le 11/09. Quelques **Torcols fourmilier**s classiquement observés en automne, avec 1 le 8/09 à Saint-Hilaire-de-Clisson (PO), 1 le 12/09 à la Pointe Saint-Gildas (EA) et 1 les 18 et 24/09 au même endroit (EA). Un **Pipit rousseline** a été signalé le 21/09 en bordure de la forêt de Gâvre (JJG), alors que 2 probables **Pipits de Richard** ont été vus en Brière le 30/10 (JLD). Un mâle de 1er hiver **Traquet du désert\*** a été vu à Sissable le 25/10 (NI). Trois **Pouillots à grands sourcils** ont été signalés cet automne dans le département : 1 le 28/09 au Croisic (OV, MB), 1 le 7/10 à Bouaye, lac de Grand-Lieu (SR) et 1 le 25/10 au Pouliguen (AL). 1 **Pie-grièche écorcheur** était encore notée le 18/09 à la Pointe Saint-Gildas (EA), en même temps qu'un **Beccroisé des sapins**, dont 14 individus étaient vus à Saint-Herblain le 27/10 (HT). Un petit afflux de **Rémiz pendulines** a été noté cet automne, en marge d'un phénomène national plus marqué, avec 8 ind. capturés à Donges le 11/10 (EA), 2 dont 1 bagué en Allemagne le 11/10 au même endroit (HD) et 2 le 19/10 au Massereau (FL). Depuis octobre, un afflux considérable de **Mésanges noires** a été noté et s'est traduit par des dizaines d'observations en Loire-Atlantique, qu'il est impossible de reprendre ici faute de place ! Le premier **Tarin des aulnes** a été vu le 15/09 à Grand-Lieu (SR). Terminons enfin sur l'observation de 2 **Bruants des neiges** à Donges-Est le 26/10 (DM, PB).



*Labbe parasite -  
Estuaire de la Vilaine  
(J.-L. Dourin)*



Une des Rémiz pendulines  
capturées à Donges-Est  
(H. Dugué)



### Mammifères (réécriture F. Normand avec l'aide de D. Montfort)

S'agissant des mammifères, notons d'abord cette observation de **Campagnol amphibie** à Boussay le 08/09 (PT), espèce en déclin dans plusieurs régions et qui fait actuellement l'objet d'une enquête nationale sous l'égide de la S.F.E.P.M. (données L.A. à transmettre à D. Montfort). Pour ce qui est des données relatives aux mustélidés, signalons cette **Belette** en action de chasse sur la même commune le 23/09 (PT) et ce **Blaireau** trouvé mort à Vieillevigne le 11/10 (JYC). Le **Renard roux** est signalé en Brière le 15/10 (JLD) et à Gétigné le 06/10 (PT) ; sa présence sur l'île Dumet est également confirmée (JLD, AT). Le **Lièvre** est mentionné sur l'île Nouvelle le 07/10 (DM). Considérée jusqu'à présent comme exceptionnelle sur ce secteur des îles de Loire, l'espèce y a fait l'objet cette année de plusieurs autres observations (FL). Plusieurs observations de **Grand Rhinolophe** ont été réalisées : 6 individus au Petit-Auverné le 23/09 et 2 à Moisdon-la-Rivière le même jour, ainsi que 2 Murins de Daubenton, espèce plus habituelle (WM). Le 24/10, deux probables **Murins à moustaches** et une **Noctule commune** sont détectés à Gétigné (WM).

**Observateurs (toutes rubriques) :** E. Archer (EA), L. Bauza (LB), P. Bellion (PB), J-Y. Clénet (JYC), F. Carrié (FC), F. Diemert (FD), J.-L. Dourin (JLD), H. Dugué (HD), M. Filou (MF), T. Guillosson (TG), J.-J. Guillou (JJG), D. Hamon (DH), N. Issa (NI), A. Lambrechts (AL), F. Latraube (FL), B. Livoir (BL), W. Maillard (WM), J. Mérot (JM), D. Montfort (DM), A. Mousseau (AM), F. Normand (FN), P. Ouvrard (PO), O. Penard (OP), D. Raboin (DR), W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), F. Roche (FR), D. Tavenon (DT), J.-P. Tilly (JPT), H. Touze (HT), P. Trécul (PT), J.-P. Trévoix (JPTr), J.-L. Trimoreau (JLT), F. Trimoreau (FT), A. Troffigué (AT) et O. Vanucci (OV).

## *Reptiles et amphibiens* (réécriture F. Normand avec l'aide de D. Montfort)

Les très nombreuses observations de **Salamandre tachetée**, parfois en grand nombre, en forêt de Touffou les 06/09, 05/10, 06/10, 16/10 et 27/10 (LB, PO), ou en Brière le 27/10 (JLD), indiquent le pic de la deuxième période annuelle de reproduction de cette espèce, qui a lieu en octobre-novembre dans notre région. La **Rainette verte** est encore signalée avant l'arrivée des grands froids le 28/10 (JYC), comme le **Crapaud commun** à Touffou le 06/09 (PO, LB). En automne, surtout par temps doux et ensoleillé (facteur favorable), il est assez classique et habituel de réentendre des mâles de Rainette verte dans des haies et des buissons, parfois loin de l'eau et souvent "déclenchés" par un bruit ou un son qui évoque, même approximativement, le chant printanier ! En été et en automne, les Rainettes peuvent s'éloigner de plusieurs centaines de mètres de leurs lieux de reproduction. La Rainette arboricole est un amphibien nomade, et les jeunes sont très erratiques. Aux Pays-Bas, un "record" de 12,6 km entre 2 pièces d'eau a été noté !

Probables derniers **Lézards verts** de la saison observés le 08/09 à Boussay (PT). Deux données particulièrement intéressantes de **Couleuvre vipérine** nous sont parvenues. La première concerne un individu remarqué à Boussay le 08/09 (PT). La seconde observation a été réalisée près du canal de la Martinière au niveau du village du Migron le 19/10 (FL) où un individu avait également été trouvé mort le 05/05 (FN). L'espèce, désormais très localisée en Loire-Atlantique (vallée de la Loire en amont de Nantes, bassin de Grand-Lieu, vallées de la Sèvre et de la Maine, étangs du nord du département...), semble donc bien présente dans cette partie sud de l'Estuaire de la Loire. Elle semble en revanche avoir totalement disparu de certains grands marais au nord, comme ceux du bassin briéron, où les dernières observations connues de ce serpent aquatique remontent à 1994. Enfin, une **Tortue** de grande taille, appartenant peut-être à l'espèce dite « Tortue de Floride », a été observée à Vioreau le 20/09 (JM). C'est aussi l'intérêt de cette rubrique que de collecter des informations sur l'existence et le développement d'éventuelles populations d'espèces allochtones dans notre département.

## *Orthoptères* (réécriture P. Trécult)

Les mois de septembre et octobre sont encore propices à l'observation de la majorité des orthoptères, voici les observations les plus remarquables réalisées au cours de cette dernière période.

- ✓ Boussay, 08/09/2008, (PT): *Aiolopus thalassinus* (**Oedipode émeraudine**), *Stenobothrus stigmaticus* (**Sténobothre nain**)
- ✓ Pointe Saint Gildas, 15/09/2008, (PT) : *Platycleis affinis* (**Decticelle côtière**), *Euchorthippus pulvinatus* (**Criquet glauque**)
- ✓ Corcoué sur Logne, 17/09/2008, (PT) : *Ruspolia nitidula* (**Conocéphale gracieux**)
- ✓ La Chevrolière, « Ruisseau de la Chaussée », 17/09/2008, (PT) : *Stetophyma grossum* (**Criquet ensanglanté**)
- ✓ St Julien de Concelles, 08/10/2008, (PT) : *Ruspolia nitidula* (**Conocéphale gracieux**)
- ✓ Gézigné, 09/10/2008, (PT) : *Oecanthus pellucens* (**Grillon d'Italie**), *Stenobothrus stigmaticus* (**Sténobothre nain**)
- ✓ Boussay, 11/10/2008, (PT) : *Oecanthus pellucens* (**Grillon d'Italie**), *Stenobothrus stigmaticus* (**Sténobothre nain**), *Calliptamus barbarus* (**Criquet de barbarie**), *Chorthippus vagans* (**Criquet des pins**).
- ✓ Forêt de Touffou, 14/11/2008, (PT, LB) : *Meconema thalassinum* (**Méconème tambourinaire**)

Je profite de ce bulletin pour vous annoncer que je projetterai lors de la prochaine assemblée générale un diaporama de présentation des principales espèces du département, j'envisage aussi d'organiser plusieurs sorties de prospection et de formation à la saison prochaine. J'invite d'ores et déjà tous ceux qui pourraient être intéressés par ce groupe d'insectes à me contacter à : [treculp@yahoo.fr](mailto:treculp@yahoo.fr).



Photos : en-haut, *Ruspolia nitidula* et en-bas, *Stetophyma grossum* (P. Trécult)

## Comment éviter la confusion Lézard des murailles - Lézard vivipare

par Didier MONTFORT (*textes et croquis*)

Deux petits Lézards «gris» sont présents en Loire-Atlantique, le Lézard des murailles, commun et largement répandu dans de nombreux habitats très variés, et le Lézard vivipare, plus rare et moins euryèce, souvent cantonné aux milieux humides et frais.

Pas toujours faciles à distinguer sur le terrain, les deux espèces présentent pourtant de nombreuses différences, assez nettes lorsque les conditions d'observation sont bonnes (... et avec l'animal en main pour certains des critères décrits ci-après).

LEZARD DES MURAILLES ( <i>Podarcis muralis</i> )	LEZARD VIVIPARE ( <i>Zootoca vivipara</i> )	Fiabilité du critère :
Museau conique et pointu (tête assez plate et allongée) ; corps large et plat.  Nombreuses petites écailles (> 20) entre l'œil et l'écaillle tympanique.	Tête non déprimée sur le dessus, et museau obtus et court ; corps épais et étroit  Ecailles assez grosses et peu nombreuses (< 20) entre l'œil et l'écaillle tympanique.	+++
Cou bien distinct, avec collerette très nette d'écailles à bord postérieur non denticulé ; gorge blanc cassé, piquetée de noir (orange, rouge ou bleu chez le ♂ en période de reproduction).	Cou assez peu marqué, avec collerette nettement denticulée ; gorge unie (bleuâtre chez le ♂ en période de reproduction).	+++
Coloration ventrale ( <i>attention : polymorphisme important</i> ) : Jeune et ♀ = en général, plutôt blanchâtre et unie (queue généralement gris clair chez les juvéniles). ♂ = en général, plutôt jaune-orangée, rouge-crème, avec, parfois, des taches bleu-ciel sur les écailles ventrales externes.	Coloration ventrale : ♀ = jaune ou orange clair, rarement ponctuée de noir. ♂ = jaune-orangé assez vif, ou orange-rouge, souvent bien tachetée de nombreux points noirs. Jeune = gris foncé.	+++
Coloration dorsale (très variable) : Jeune et ♀ = unie, gris-brun, parfois olivâtre, avec, souvent, une ligne vertébrale sombre plus ou moins continue. ♂ = gris, brun, rougeâtre ou verdâtre, souvent réticulée ou tachetée de sombre et de blanc, contrastée ; ligne dorsale parfois absente.	Coloration dorsale : Adulte = brun-chocolat, jamais vert, avec une bande vertébrale sombre plus ou moins nette et plus ou moins régulière. Jeune = noirâtre (brun foncé, bronze noirâtre ou noir luisant).	++
Flancs : jeune et ♀ = sombres, délimités par deux lignes claires plus ou moins continues. ♂ = le plus souvent, mosaïque réticulée de taches noires, de taches bleu-ciel, de taches claires ... discontinues.	Flancs (polymorphisme important) : ♀ = sombres, délimités par deux lignes claires discontinues. ♂ = idem, mais moins sombres, moins marqués que chez la ♀. Jeune = foncés, presque noirs.	++
Ecailles dorsales petites et fines.	Ecailles dorsales assez grosses et d'aspect perlé.	++
Queue très longue et effilée.	Queue assez courte et assez épaisse.	++
Pattes fines avec de longs doigts.	Pattes et doigts assez courts.	+

## **Comment éviter la confusion Lézard des murailles - Lézard vivipare (*suite*)**

A noter aussi :

- ✓ plus de 4 petits granules entre les écailles supraoculaires et les écailles supraciliaires chez le Lézard des murailles, et seulement entre 0 et 4 chez le Vivipare ;
- ✓ un 4<sup>ème</sup> orteil beaucoup plus long que la distance œil-tympan chez le Lézard des murailles, et à peine plus long chez le Vivipare ;
- ✓ l'écaille occipitale moins longue que la pré-occipitale chez le Lézard des murailles, subégale chez le Vivipare ;
- ✓ 13 à 27 pores fémoraux (pores situés à la face interne des cuisses, plus marqués chez les ♂ que chez les ♀) chez le Lézard des murailles, et seulement 5 à 15 chez le Vivipare, ...

De manière générale, en ce qui concerne les reptiles et les amphibiens d'Europe, se reporter à la dernière édition de l'excellent « Guide herpéto » (N. Arnold et D. Ovenden), chez *Delachaux & Niestlé* éd.

### ***Invitation à l'Assemblée Générale 2008***

L'AG 2008 est prévue le samedi 6 décembre 2008 à 18h à la Maison de la Réserve naturelle à Bouaye.  
Parmi les points à l'ordre du jour :

- Rapport d'activité, rapport financier,
- Renouvellement partiel du Conseil d'Administration,
- Cotisation 2009,
- Questions diverses

Comme prévu dans nos statuts, toute nouvelle candidature doit parvenir préalablement au Président pour être valide, ce dernier se réservant le droit de faire appel à des candidatures spontanées lors de l'AG. Les questions diverses éventuelles que vous souhaiteriez voir traitées par l'Assemblée Générale doivent également être adressées préalablement au Président.

L'AG statutaire devrait se dérouler de 18 à 19h environ, et sera suivie d'un pot, comme à l'accoutumée. Merci à tous de bien vouloir amener un petit quelque chose à partager ! Plusieurs projections d'images sur différents thèmes seront également proposés simultanément.

### ***Actualités du GNLA***

**Chronique Naturaliste 2008 :** Le chronique 2008 sera bouclée en fin d'année et distribuée au début de janvier 2009. Vous pouvez encore adresser vos projets de textes, notes et articles à Sébastien Reeber ([sébastien.reeber@wanadoo.fr](mailto:sébastien.reeber@wanadoo.fr)) pour en discuter !