

Groupe Naturaliste Loire-Atlantique

Bulletin n°48 - Novembre et décembre 2011

Bulletin du GNLA



Photo P. Bellion

L'Assemblée Générale du GNLA se tiendra à Frossay (salle du Quai Vert), le samedi 10 mars 2012 à 14 heures. Une sortie est proposée le matin au Massereau (RV salle du Quai Vert à 9h00). Après l'AG, un diaporama sur les amphibiens et reptiles du bassin méditerranéen vous sera présenté par Philippe Evrard.

Groupe Naturaliste Loire-Atlantique
9 , rue de Nantes - 44830 Bouaye

Les actualités naturalistes...

OISEAUX (rédaction H. Touzé)

Ndlr : Cette rubrique reprend les observations récentes d'oiseaux en Loire-Atlantique, parvenues au GNLA par le biais du forum électronique et de la base de saisie en ligne « faune-Loire-Atlantique » à laquelle le GNLA contribue. Les données marquées d'astérisques sont mentionnées sous réserve d'homologation régionale (*) ou nationale (**).

Cygne noir : 2 ind. sont notés dans les Marais de Guérande à partir du 6/11 (GC et al.) jusqu'au 12/11 ; 2 ind. le 13/11 à l'Étang de Tesdan, Avessac (ON).

Oie rieuse : 9 dont 5 de 1^{er} hiver parmi des Oies cendrées le 14/11 au Lac de Grand-Lieu (SR) ; les premiers oiseaux notés sur l'île de Pierre Rouge, Lavau-sur-Loire, site devenu traditionnel pour l'hivernage de cette espèce, sont observés le 27/11 (HC) et le maximum est de 52 oiseaux le 10/12 (FR).

Bernache du Canada : Toujours la cinquantaine d'individus au Marais de Mazerolles, Saint-Mars-du-Désert.

Bernache de Hutchins : L'individu échappé de captivité (bague plastique) du Marais de Mazerolles, Saint-Mars-du-Désert est toujours sur le site durant la période concernée.

Bernache nonnette : 1 (origine inconnue) le 11/11 aux Belloutières, Joué-sur-Erdre (VT) ; 1 le 21/11 à la Balise Pineau, Couëron (DT) ; l'espèce est notée sur l'île de Pierre Rouge, Lavau-sur-Loire à partir du 27/11 puis durant toute la période concernée sur ce site, avec un maximum de 7 oiseaux le 27/11 (HC).

Bernache cravant à ventre sombre (hors littoral) : 1 oiseau de première année le 6/11 au Port de Blain (BN).

Bernache cravant à ventre pâle * : 1 ad. est noté le 1/11 en Baie de Pen-bé / Assérac (AG) et revu le 12/11 (AG, CS).

Bernache cravant du Pacifique * : Le mâle habituel est revenu dans les Traicts du Croisic à partir du 11/09 (ALN).

Tadorne casarca : le couple de l'Étang des Gâtineaux est toujours présent durant la période concernée.

Sarcelle d'été : 1 oiseau tardif de première année le 21/11 au Lac de Grand-Lieu (SR).

Fuligule milouinan : 1 femelle à Roches Alluard, Corsept le 4/11 (DC) ; 2 ind. le 26/11 à la STEP du Salineau, Les Moutiers-en-Retz (OPo, DC, RC).

Eider à duvet : 1 le 12/11 aux Rochers du Bourg, Saint-Brevin-les-Pins (BL) ; 1 le 24/12 au Brouilllis / Piriac-sur-Mer (AGer).

Garrot à œil d'or : 1 individu de première année à partir du 8/12 et jusqu'au 24/12 au Port du Collet / Les Moutiers-en-Retz (JYF, XH, WM) ; 1 au Lac de Grand-Lieu le 28/12 (SR).

Harle bièvre : 1 le 22/11 à la Plage des Carrés, La Bernerie-en-Retz (Ass. Hirondelle) ; 5 le 11/12 à la Saline des Baules, Batz-sur-Mer (Anonyme) ; 2 le 18/12 à l'Étang de Vioreau, Joué-sur-Erdre (CM).

Érismature à tête blanche ** : le mâle du Lac de Grand-Lieu est revu à partir du 22/12 (SR).

Plongeon arctique : 1 le 6/11 en vol au dessus de la Saline Gau, La Turballe (JM, AM, WR) ; 1 le 27/11 dans la Rade du Croisic, La Turballe (SR et al.) ; 1 le 24/12 au Platin du Fort, Préfailles (WM).

Plongeon imbrin : 1 le 2/11 à la Pointe du Croisic, Le Croisic (CS, CG, SM) ; 2 à la Pointe du Croisic le 5/11 (CS, CG) et 1 le 06/11 (DC, RC) au même endroit ; 1 les 3 et 9/12 à la Plage du Nau, Le Pouliguen (JB, MM) ; 1 le 21/12 à l'Anse de Toulin, Le Pouliguen (MD) ; 1 le 24/12 au Brouilllis, Piriac-sur-mer (AGer).

Grèbe esclavon : 1 le 22/11 à la STEP du Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Ass. Hirondelle) ; 1 le 17/12 dans le Chenal de Pen-Bron, Guérande (GR, CM et al.) ; 1 le 20/12 à Port-aux-Rocs, Le Croisic (YB) ; 1 le 21/12 à la Plage du Nau, Le Pouliguen (MD) ; 1 le 22/12 à l'Étier de la Saline neuve, Batz-sur-Mer (AG) ; 1 le 28/12 dans le Petit Traict, Guérande (TH).

Océanite tempête (hors littoral) : 1 le 16/12 au Lac de Grand-Lieu (SR).

Océanite culblanc : 1 le 16/12 au Lac de Grand-Lieu (SR).



Océanite culblanc, Grand-Lieu (S. Reeber)

*Grues cendrées, *Ancenis* (P. Bellion)*

Butor étoilé : 1 le 6/11 à Bouaye (BL) ; 1 à Cohignac, Blain le 15/11 (Bruno Jauny fide AM) ; 1 le 17/12 aux Pâtureaux Julien, Couëron (FR) ; 1 oiseau est noté le 19/12 à Frossay (JLC).

Ibis falcinelle * : 1 est noté le 22/11 au Lac de Grand-Lieu (SR) ; 1 le 11/12 au dortoir à Lyarne, Les Moutiers-en-Retz (Ass. Hirondelle).

Balbuzard pêcheur : 1 le 4/11 à l'Étang de Sandun, Guérande (EB).

Milan Royal : 1 le 3/11 à La Bouie, Bourgneuf-en-Retz (DC) ; 1 le 10/11 au Pontereau, Fresnay-en-Retz (OP) ; 1 le 12/11 au Rocher du Grand Autel, Le Croisic (VT) et 1 ce même jour aux Chardons bleus, La Turballe (GB) ; 1 le 22/12 au Poteau, La Bernerie-en-Retz (OP).

Buse pattue ** : rapace nordique exceptionnel dans le département, 1 oiseau est découvert le 18/11 en Brière et il sera par la suite revu au mois de janvier au moins (AT).

Autour des palombes : 1 femelle est observée le 19/12 à la Queterae, Mésangers (MB).

Grue cendrée : Afflux remarquable dans l'ouest de la France cet automne, la Loire-Atlantique est largement concernée puisque entre le 6 et le 21 novembre, de nombreuses observations ont été effectuées. Les maximums ont été notés les deux premiers jours :

Le 6/11 : 30 à la Vigie Romain, Le Croisic (BG), 14 à Varades (TH, PB), 56 à Sissable, Guérande (DC, RC) ; 51 à la Saline Gau (PO, WM) ; environ 40 à Rousselin, Bousay (PT) ; 175 au Marais de Grée, Saint-Herblon (LB, PB, MB, TH) ; 26 au Piloquet, Varades (TH, PB) ; 11 à la plage de Grand Casse-caillou, Batz-sur-Mer (BG) ; un vol entendu de nuit au Frostidié, Assérac (AJ) ; 20 à la Trocardière, Rezé (ME) ; 37 à la Gorsonnière, Touvois (FS) ; 32 à la Doussinière, Sucé-sur-Erdre (JB) ; environ 54 à la Casse, Machecoul (PJ) ; 18 à la Basse Chédorgière, Treillières (JPP) ; environ 138 au Garambeau, Treillières (AF) ; 17 à La Chapelle-Basse-Mer (JLN) ; 11 entre la Chapelle-des-Marais et Sainte-Reine-de-Bretagne (DM).

Le 07/11 : 2 au Pont du Briolet, La Turballe (CG, YB, JPT) ; 16 à Trentemoult, Rezé (BL) ; 9 à la Guilloterie, Saint-Mars-du-Désert (PO) ; 17 à la Vallée, Guérande (PDV) ; 13 au Corps de Garde, Guérande (GC) ; 16 à Beaulieu, Nantes (JM, WR) ; environ 15 à l'Étier du Dareau, Couëron (G. Leray fide FL).

Par la suite, une cinquantaine d'oiseaux le 10/11 à Saint-Mihiel, Nantes (JLG) et 1 à la Savaudière, Carquefou ce même jour (AN) ; 6 à la Saline Gau le 11/11 (HT) ; 5 à Tuloc, Guérande le 12/11 (JPT) et 5 ce même jour à Pradel, Guérande (les mêmes ?) (FH, PBi) ; 30 au Parc paysager de la Moutonnerie, Nantes le 13/11 (JLG) et 1 ce même jour à Pen-Bron (DM) ; 2 au Lac de Grand-Lieu le 15/11 (DD) ; une dizaine d'oiseaux le 16/11 à l'Ancien Palais de Justice / Nantes (AE) ; 1 le 18/11 à Saint-Victor, Issé (JM) ; 1 le 20/11 à la Pointe du Pont de Bois, Mesquer (CG) ; 6 à Blanche Lande, Oudon le 21/11 (PF).



Edicnème criard : Maximum et dernière date le 9/12, à Saint-Hilaire-de-Clisson, avec 56 individus (PO).

Bécasseau cocorli : 1 tardif le 21/11 à Grand-Lieu (SR).

Bécasseau à longs doigts ** : Premier mention française de ce limicole qui se reproduit en Sibérie et hiverne en Asie. L'individu est découvert sur la saline Gau, La Turballe le 1/11 (OV), il est réobservé le 05/11 (EA) et son identification est confirmée le 6/11 (JM, AM, WR et al.). L'oiseau n'est pas réobservé du 11/11 au 18/11, puis il est retrouvé le 19/11 (SR, MC) et revu jusqu'au 21/12. Par la suite, il ne sera plus vu, puis, de nouveau retrouvé, à la mi-janvier (voir prochain bulletin).



Bécasseau à longs doigts, La Turballe (A. Le Calvez)



Chevalier sylvain : Nouveau cas d'hivernage après celui de l'année dernière, un oiseau est vu à partir du 27/11 et jusqu'en janvier 2012 au moins (GB et al.).

Bécassine sourde : Toujours très peu de données en raison des habitudes discrètes de l'espèce et du peu de recherches spécifiques de la part des observateurs, une seule donnée provenant du Marais de Petit-Mars le 13/11 mais l'individu est malheureusement tué à la chasse... (*fide* VT).

Phalarope à bec large : 1 le 11/11 à la Pointe du Bec, Pornichet (JB) ; 3 oiseaux ensemble le 17/12 à la Pointe du Closillot, Piriac-sur-Mer (HT).

Labbe pomarin : 1 le 2/11 à la Pointe du Croisic, Le Croisic (CS, CG, SM) ; 1 oiseau de première année le 16/12 au Lac de Grand-Lieu (SR).

Goéland à bec cerclé * : 1 oiseau 1^{er} hiver le 28/12 au Lac de Grand-Lieu (SR).

Goéland Pontique * : Espèce rare dans le département et encore plus sur le littoral, 1 oiseau de premier hiver est observé à Port-val, Le Croisic le 1/11 (WR).

Goéland Bourgmestre * : 1 oiseau de première année le 16/12 à la Pointe du Closillot, Piriac-sur-Mer (GB).

Goéland à ailes blanches ** : l'afflux remarquable de cet hiver s'est traduit dans le département par la présence d'un oiseau de première année le 22/12 au Lac de Grand-Lieu (SR) d'autre seront vus par la suite (voir prochain bulletin).

Pic Mar : Donnée concernant 1 individu, en dehors des zones connues, à Conquereuil le 19/12 (AM).

Torcol fourmilier : 1 tardif le 12/11 aux Maisons neuves, Les Moutiers-en-Retz (DC).

Rousserolle effarvatte : 1 tardive baguée le 13/11 au Lac de Grand-Lieu (OPO).

Mésange noire : 1 seule donnée durant la période concernée, au moins 3 oiseaux le 21/12 à la Lanterne des Morts, Les Moutiers-en-Retz (OP).



Goéland bourgmestre, Piriac (G. Bertiau)



Goéland à ailes blanches, Grand-Lieu (S. Reeber)

Goéland pontique, le Croisic (W. Raitière)



Tichodrome, Nantes (O. Poisson)



Panure à moustache : en dehors du site connu de Donges où l'espèce est régulièrement contactée, 1 le 18/11, 2 le 20/11 et 4 le 22/11 à Léniviquel, Guérande (AV, GC, CG, JB) ; 1 le 22/11 (minimum) aux Maisons brûlées, Guérande (AG) ; 1 le 19/12 à Sissable, Guérande (MD) et un minimum de 5 ce même jour au Massereau, Frossay (JLC).

Rémiz penduline : Plusieurs individus sont découverts à partir du 6/11 et jusqu'au 17/12 (revues en 2012) aux Maisons neuves, Les Moutiers-en-Retz (OP), l'effectif maximum observé sera de 9 individus le 9/11 (OP).

Tichodrome échelette * : 1 oiseau le 18/11 sur le Château de Pornic (IL). Peut-être est-ce le même individu que celui ayant hiverné dans le bourg de Pornic durant l'hiver 2009-2010 ; 1 individu du 19/11 au 21/11 à la Cathédrale Saint-Pierre, Nantes (MPH et al.).

Bruant fou * : Un oiseau est découvert sur les coteaux rocheux de Mauves-sur-Loire le 19/11 (JM).

Sizerin flammé : 1 individu le 16/12 à Grand-Lieu (SR).

Perruche à collier : 1 au Pouliguen, le 22/11 (OV) et 1 le 25/11 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (DC).

Rémiz penduline, Les Moutiers-en-Retz (O. Penard)



Chiroptères (réécriture Ph. Defernez)

Hors du sujet ordinaire de cette synthèse, le Groupe Chiro salue lors de sa réunion le travail de Laurent Gouret, son initiateur, qui passe la main. Bonne continuation Laurent... Quand arrive novembre, on pourrait s'attendre à voir les chiroptérologues entrer dans un hivernage soporifique et les chauves-souris en léthargie au fond d'une galerie souterraine ou d'une cave. Mais après l'automne 2010 qui avait vu un froid intense et durable s'installer, cette année 2011 nous a réservé une douceur prolongée qui a quelque peu brouillé les cartes.

De fait, il faut attendre le 25 novembre pour engranger la première observation de la période : CM a déniché un **Murin à moustaches** endormi dans une petite dépendance du site de Madime à Bouguenais. Et ce sera la seule observation notée pour ce mois. Et décembre débute aussi en douceur, au propre comme figuré : il faut attendre le 7 du mois pour lire la première mention d'un **Murin de Daubenton** que PB a trouvé sous un pont entre Boussay et Montfaucon-Montigné (49). C'est ensuite BN qui rapporte la visite d'un pont entre Blain et Héric où il a observé 7 *Myotis* dont 2 **Murins de Natterer** et un **Murin de Daubenton**, les autres restant à déterminer.

Plus tard, le 30, PhD et BN ont visité une série de ponts sur les communes de Guémené-Penfao et Pierric en compagnie de YP. Ils n'en ont retiré que très peu d'observations : un **Murin de Natterer** au pont de la Rinaie à Conquereuil ainsi que 4 **Oreillards roux** au pont de Triguel à Pierrick. Dans l'après-midi, PhD a poursuivi vers l'Est pour noter plusieurs ponts inoccupés mais tout de même 3 **Murins de Bechstein** et un **Murin de Natterer** aux Forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines. De son côté, TLC visitait quelques ponts dans les environs de Vallet, ne trouvant que 2 **Murins de Natterer** sous l'un d'entre eux.

Par ailleurs, « Chauves-souris Infos » n'hiberne pas non plus : le 13 décembre un appel est transmis. Il concerne un problème d'odeurs gênantes dans les combles du local des services techniques de Pont-Saint-Martin. D'autre part, il semble que quelques données soient passées aux oubliettes lors de la rédaction de la précédente synthèse. Elles sont à mettre au crédit de FD et date du WEPTA GNLA/GMB en Pays de Retz. Ces observations ont été réalisées avec le concours de l'Association Hirondelle. Pour une part, elles remontent à Juillet dernier (le 11, c'est un cadavre et un groupe d'**Oreillard sp.** découverts dans la chapelle de Prigny aux Moutiers-en-Retz – le 25, un comptage sur les mêmes lieux donne 38 **Oreillard sp.** et 19 **Pipistrelles communes** – le 28, un autre comptage, à l'école de Chauvé, donne 48 **Oreillard sp.** et 19 **Pipistrelles communes**). Enfin, accompagné de trois personnes, FD signale la détection des émissions ultrasonores de **Pipistrelle commune**, **Sérotine commune** et **Pipistrelle de Nathusius** dans les allées boisées et près du domaine de Noirbreuil... Avec nos excuses.

Autres Mammifères (réécriture F. Normand avec l'aide de D. Montfort)

Parmi les données notables de la période, sont à retenir : **Genette** : 2 crottes sur les bords de Sèvre à Gétigné (PT) le 23/10, 1 individu observé au Pont de la Turmelière, Maisdon-sur-Sèvre, le 23/12 ; **Mucardin** : une vingtaine de noisettes rongées en bordure de la Forêt Pavée, Moisdon-la-Rivière le 28/10 (PR). **Loutre** : épreintes sur le Cens à Nantes le 06/12 (TLC, NC).

Reptiles et Amphibiens (réécriture F. Normand avec l'aide de D. Montfort)

Voici les données les plus remarquables à retenir pour cette période :

Couleuvre d'Esculape : dernière observation de la saison le 2/11 avec un individu d'environ 140 cm tué sur le périphérique nantais (OP).

Vipère péliade : dernière observation de la saison avec un individu mort à la Livaudais, Sainte-Anne-sur-Brivet le 3/11 (DM).

Vipère aspic : dernière observation de la saison avec un individu mort à la Grande Haie Durand, la Montagne, le 30/10 (AO).

Coronelle lisse : dernière observation de la saison avec un individu à la Livaudais, Sainte-Anne-sur-Brivet le 03/11 (DM).

Couleuvre vipérine : dernière observation de la saison avec un individu mort au Migron le 19/10 (FN).

Orvet : dernière observation de la saison avec un individu à la Coutancière, la Chapelle/Erdre, le 18/10 (CL).

Salamandre tachetée : 92 individus à la Cassardière, Vertou le 18/10 (AV et al), 30 avec des accouplements le 18/10 à Touffou (LBa), environ une trentaine d'individus à Haute-Goulaine le 25/10, et 95 à Maisdon-sur-Sèvre (LBa).

Crapaud commun : 5 individus à Touffou le 18/10 (LB).

Crapaud calamite : 8 individus dans les dunes de Batz-sur-Mer le 08/11 (DM), 1 sur l'île de Rostu, Mesquer le 27/11 (JLC).

Triton de Blasius : 1 individu le 04/11 en Forêt de Touffou le 04/12 (PO, LBa).

Erratum : dans le Bulletin n°46, il est fait mention d'une observation le 4/06 d'un Lézard vivipare à la Haye-Fouassière. Il s'agit d'un Lézard vert. Par ailleurs, la Couleuvre verte-et-jaune photographiée l'a été à Boussay et non à Bouaye. Désolé pour ces deux erreurs de légende...

Lépidoptères, Odonates et Orthoptères (réécriture P. Trécul)

Les mois de novembre et décembre n'étant pas, pour des raisons climatiques évidentes, la période la plus propice à l'observation des insectes, nous n'aurons que peu d'informations intéressantes à faire valoir dans ce bulletin. Ceci-dit, retenons, pour les orthoptères, les observations tardives de deux espèces de Méconèmes (petites sauterelles arboricoles). JPT observe un mâle de *Cyrtaspis scutata* (Méconème scutigère) à Guérande le 13/11, tandis que PT découvre par hasard une femelle de *Meconema meridionale* tombée au sol en forêt de Touffou le 26/11. Il semble intéressant de signaler, d'un point de vue phénologique que les observations de rhopalocères comme le **Vulcain** ou le **Paon de jour** ont été ininterrompue durant ces deux mois du fait d'une météo exceptionnellement douce, et que, du côté des odonates, des imagos ont été observés jusqu'au 2/12 (*Sympetrum striolatum* aux Moutiers en Retz, PT).

Observateurs (toutes rubriques) : E. Archer (EA), E. Barussaud (EB), L. Bauza (LBa), J. Bazus (JB), M. Bellion (MB), L. Bellion (LB), M. Bellion (MB), P. Bellion (PB), G. Bertiau (GB), P. Bizien (PBi), J. Bourlès (JB), A. Bourreau (AB), Y. Brilland (YB), N. Chenavat (NC), H. Chevalier (HC), J.-L. Chil (JLC), D. Cleva (DC), R. Cleva (RC), G. Couroussé (GC), M. Daval (MD), L. Defernez (LD), Ph. Defernez (PhD), F. Diemert (FD), J.-L. Dourin (JLD), S. Dulau (SD), D. Dupont (DD), M. Escalle (ME), A. Even (AE), JY. Frémont (JYF), P. Frin (PF), A. Frison (AF), J.-L. Gasnier (JLC), C. Gentric (CGe), A. Gergaud (AGer), C. Gouraud (CG), D. Grandière (DG), F. Halligon (FH), T. Hasle (TH), T. Heugas (TH), M.-P. Hindermeyer (MPH), X. Hindermeyer (XH), A. Jégo (AJ), P. Joice (PJ), D. Lafage (DL), B. Lamarche (BL), B. Lebascle (BL), T. Le Campion (TLC), A. Lekieffre (AL), V. Lelant (VL), M. Lelong (ML), A. Le Nevé (ALN), B. Livoir (BL), S. Mabil (SM), M. Maillard (MM), W. Maillard (WM), C. Martin (CM), J. Mérot (JM), D. Montfort (DM), C. Morvan (CM), A. Mousseau (AM), J.-L. Naudin (JLN), A. Neau (AN), O. Noël (ON), B. Normand (BN), A. Oates (AO), P. Ouvrard (PO), J.-P. Pasquier (JPP), O. Penard (OP), Y. Piquot (YP), J.-L. Plantard (JLP), O. Poisson (OPo), A. Racine (AR), W. Raitière (WR), S. Reeber (SR), G. Riou (GR), F. Roche (FR), Pascal Rolland (PR), F. Semavoine (FS), V. Tanqueray (VT), J.-P. Tilly (JPT), H. Touzé (HT), P. Trécul (PT), A. Troffigué (AT), D. Turmel (DT), O. Vanucci (OV) et A. Viaud (AV).

Identifier le Pâturen des marais *Poa palustris* L.

par Stéphane DULAU

L'objectif de cette note est de fournir des éléments de repérage et d'identification du Pâturen des marais *Poa palustris*, poacée (=graminée) d'intérêt patrimonial, proche du très courant Pâturen commun *Poa trivialis*.

Statut : Bien que non protégé, le Pâturen des marais présente un intérêt patrimonial certain :

Classe de rareté en Loire-Atlantique : Assez rare

Liste "rouge" armoricaine : LRMA 0 * = taxon prioritaire à rechercher

Liste "rouge" régionale Pays de la Loire : An. 3 * = taxon en danger de disparition en Pays de la Loire ; prioritaire pour la mise en œuvre de mesures urgentes de conservation

Espèces déterminantes Pays de la Loire : « X »

Liste "rouge" Loire-Atlantique : An. 5 = quasi-menacé en Loire-Atlantique


Dans le département, la vallée de la Loire est son bastion principal. Il est également présent dans la vallée de l'Erdre et plus localement dans la vallée du Don. Il atteint sa limite occidentale en France à l'est de la Loire-Atlantique.

Habitat : On rencontre le Pâturen des marais à la périphérie des zones inondables, dans les roselières et sur les rives boisées des cours d'eau. On prêtera donc une attention particulière aux grands pâturens rencontrés dans les végétations marécageuses.

Identification : Le Pâturen des marais est souvent méconnu du fait de sa ressemblance avec le Pâturen commun *Poa trivialis*, espèce très répandue en particulier dans les prairies fraîches. Les descriptions figurant dans le tableau suivant soulignent la proximité des deux espèces, mais également quelques traits caractéristiques (**en gras soulignés**). Les photos qui suivent aideront à l'identification dans le milieu naturel.

Poa palustris

Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, glabre, à souche fibreuse ou un peu traçante ; tiges dressées ou ascendantes, grêles, cylindracées, lisses ; feuilles planes, acuminées, rudes, à **gaines lisses, celle de la feuille supérieure généralement plus courte que le limbe** ; **ligule ovale ou oblongue** ; panicule grande, pyramidale, étalée-diffuse, à rameaux inférieurs réunis par 4-7 en demi-verticilles ; épillets ovales, à 2-4 fleurs réunies à la base par des poils laineux ; glumes inégales, trinervées ; **glumelle inférieure** lancéolée, ciliée dans le bas sur la carène et les bords, **à 5 nervures peu distinctes. Epillets souvent panachés de jaune et violet**



Source : COSTE

Poa trivialis

Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à souche fibreuse ou un peu traçante ; tiges ascendantes, cylindracées, rudes dans le haut ; feuilles planes, acuminées, rudes, à **gaines scabres, celle de la feuille supérieure plus longue que le limbe** ; **ligule oblongue aiguë** ; panicule grande, pyramidale, étalée, à rameaux inférieurs réunis par 4-6 en demi-verticilles ; épillets ovales, à 2-4 fleurs un peu velues-laineuses à la base ; glumes inégales à 1-3 nervures ; **glumelle inférieure** ovale-aiguë, ciliée dans le bas sur les nervures, **à 5 nervures saillantes.**




Source : COSTE




Poa palustris, panicule



Poa palustris, ligule



Poa palustris, détail de l'épillet,
glumelles inférieures (=lemmes)
panachées de jaune et violet



Poa palustris, épillet
(la plus petite graduation = 0,5 mm)